

La maladie inflammatoire chronique et la grossesse : amorçons la conversation!



Le sondage canadien sur la maternité et l'auto-immunité (AIM) a révélé les préoccupations et les lacunes en matière d'information liées à la grossesse et à l'allaitement de femmes atteintes de maladies inflammatoires chroniques, telles que la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, le rhumatisme psoriasique et le psoriasis.

Ce sondage démontre à quel point il est nécessaire pour les femmes atteintes de ce type de maladies d'avoir des discussions proactives concernant la planification familiale.

Avant la grossesse



43 %

des femmes avaient des craintes qui les ont poussées à remettre à plus tard leur projet d'avoir un enfant

Raisons d'avoir repoussé le projet de grossesse citées par ces femmes

45 % d'entre elles avaient peur de transmettre leur maladie à leur bébé

26 % d'entre elles ne se sentaient pas en assez bonne forme physique



52 %

des femmes n'avaient pas planifié leur grossesse



60 %

des femmes ayant une maladie inflammatoire chronique qui avaient discuté de leur désir d'avoir un enfant avec un professionnel de la santé ont indiqué que c'était elles qui avaient dû amorcer la conversation à ce sujet.



37 %

des femmes ont indiqué qu'elles ont interrompu leur traitement en vue d'avoir un enfant ou en raison d'une grossesse



Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter le site

www.aimotherhood.ca

RÉFÉRENCES :

- Présentation de l'étude Women of Childbearing Age (WoCBA). Novembre 2018; mise à jour le 19 novembre.
- Arthritis Research UK. Pregnancy and arthritis. Consulté à l'adresse : <http://www.arthritisresearchuk.org/arthritisinformation/daily-life/pregnancy-an-arthritis.aspx>. Consulté en janvier 2018.
- Legwohl M, Van Vorhees AS, Siegel M, et al. A Comprehensive Survey Assessing the Family Planning Needs of Women with Psoriasis. Affiche présentée lors du 5^e Congrès mondial sur le psoriasis et le rhumatisme psoriasique; du 27 au 30 juin 2018; Stockholm, Suède.

Durant la grossesse



77 %

des femmes n'ont pas consulté leur dermatologue durant leur grossesse



83 %

des femmes n'ont pas consulté leur rhumatologue durant leur grossesse

Après l'accouchement



46 %

des femmes s'inquiétaient modérément ou beaucoup des conséquences d'un traitement pendant l'allaitement



62 %

des femmes estimaient qu'elles ne devraient pas allaiter pendant qu'elles recevaient un traitement



22 %

des mères qui avaient interrompu leur traitement pendant leur grossesse se sont fait conseiller d'attendre une première poussée de la maladie après l'accouchement avant de reprendre leur traitement